

KONTAKTNÍ INFORMACE


Sídlo firmy:

BEST spol. s r.o.

Přemyslovců 60
747 07 OPAVA
Czech Republic

Tel: +420 553 780 211
Fax: +420 553 780 212

E-mail: info@best-opava.com
www.best-opava.com



BEST LÍHEŇ KUŘAT

PRODEJ KUŘAT

Prodej: pondělí, úterý: 7:00 – 9:00
čtvrtek, pátek: 7:00 – 9:00

Cena: 10,- Kč/ ks

Aby byl Váš požadavek splněn, objednejte si kuřata předem telefonicky.

BEST spol.s r.o.
Přemyslovců 60
747 07 Opava - Jakař
tel.: +420 553 780 211
fax: + 420 553 780 212



POSTUP CHOVU JEDNODENNÍCH KUŘAT (BROJLERŮ) PRO DROBNOCHOVATELE

Jednodenní výkrmová kuřata – brojleři, jsou hybridi vyšlechtění na vysokou užitekost, tj. vysoké váhové přírůstky v době výkrmu, která trvá cca 40 - 45 dní.

Aby bylo dosaženo požadované hmotnosti brojlera v tomto stáří, je nutné splnit následující základní požadavky :

1. Teplota prostředí

Kuřata je třeba již po převozu z líhně dát do vyhřátého prostoru. V prvním dni by se teplota měla pohybovat cca na 32 °C, každý 2.-3. den se snižuje o 1 stupeň, ke konci výkrmu by však neměla klesnout pod 18 °C.

Je třeba si uvědomit zásadu, že pokud je teplota nízká, kuře si vytváří energii "na zahřátí" z krmiva a netvoří tak svalovou hmotu svého těla.

2. Podestýlka

Jednodenní kuřata lze nastájit i na papírovou podložku (novinový papír), u starších kuřat je ale třeba mít podestýlku s větší nasávací schopností, tedy hobliny, drcenou slámu, plevy ...

Podestýlka musí být suchá a kyprá. V žádném případě nesmí být plesnivá, dochází pak k onemocnění dýchacích cest s následným úhynem kuřat !!!

3. Napájení

V prvních 24 hodinách je voda pro brojlera vůbec nejdůležitější. Kuře musí mít po celou dobu výkrmu přístup k pitné nezávadné vodě o teplotě 10 - 12 °C. Napáječky musí být čisté. Pro dobrý start ve výkrmu se používají podpůrné vitamínové přípravky, které se přidávají do pitné vody, a to ihned v prvním dni. Jsou to přípravky Aminofarm nebo Promotor, které se pro drobnochovatele prodávají v lékárnách v malém balení. Jsou cenově dostupné a velmi dobře se rozpouštějí ve vodě. Dávkování je velmi jednoduché, návod je přiložen ke každému balení.

4. Výživa

Přibližně 70% nákladů na výkrm činí náklady na krmivo. K dosažení požadovaného efektu doporučujeme použít standardní krmné směsi :

BR1	od 1. do 10. - 15. dne stáří
BR2	od 15. do 35. dne stáří
BR3	od 35. dne do konce výkrmu.

Touto směsí (BR 3) je velmi důležité krmit nejméně 5 dní před poražením kuřat.

Celý efekt výkrmu výrazně ovlivňuje výživa kuřat na počátku výkrmu. Proto lze u drobnochovatelů přidávat malým kuřatům vařené vejce natvrdo (nastrouhat do krmiva asi 1 vejce na 20 kuřat), je možné přidat i trochu tvarohu, nikdy však nepřipravovat na delší dobu dopředu. V žádném případě nekrmte kuřata pouze namočeným chlebem, rohlíky, bramborami !!!

Krmivo musí být zdravotně nezávadné - směsi nelze dlouhou dobu skladovat anebo kupovat levné směsi s prošlou záruční lhůtou. Hrozí nebezpečí zaplísnění a žluknutí tuků a v důsledku toho dochází k vysokému úhynu kuřat.

5. Ovězduší

Rovnoměrný přísun čerstvého vzduchu uvnitř výkrmny je nezbytný pro zdraví a růst kuřat. Během výkrmu produkují brojleři látky znečišťující prostředí - oxid uhličitý, čpavek, prach, vlhkost. Proto je nutné po celou dobu výkrmu prostředí odvětrávat. Pokud tomu tak není, hrozí nebezpečí onemocnění kuřat.

6. Osvětlení

Pokud nemáme k dispozici prostor s okny, je třeba kuřatům přisvětlovat po celou dobu výkrmu (světelný zdroj může být zároveň i zdrojem tepla). Kuře potřebuje osvětlený prostor pro orientaci ke krmivu a vodě. Od druhého týdne se může intenzita světla snížit. Světlo by nemělo být moc ostré - hrozí nebezpečí kanibalismu (kuřata se ozobávají). Výkrmový prostor by měl být mírně osvětlen i v noci.

Při dodržování těchto zásad lze za 45 dní dosáhnout živé hmotnosti cca 2,4 kg. Spotřeba krmiva na kilogram přírůstku činí max. 2 kg krmné směsi.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na uvedených telefonních číslech.

Přejeme Vám hodně chovatelských úspěchů, radost z dosažených výsledků výkrmu a dobrou chuť.

pracovníci líhně Opava – Jaktar

